


MASGONE

PEKATAN TEREMULSI (EC) RACUN SERANGGA / INSECTICIDE / 殺蟲劑

No. Pendaftaran : LRMP. R1/9209

Kandungan Bersih : 1 liter



Perawis Aktif : propoxur 18.7% w/w
Perawis Lengai : 81.3% w/w

Tarikh Mengilang :

Jika berlaku KERACUNAN, sila hubungi :

PUSAT RACUN NEGARA - 1 - 800 - 88 - 8099 (waktu pejabat)

- 012 - 430 9499 (lepas waktu pejabat)

BACA LABEL SEBELUM GUNA

UNTUK DIKENDALIKAN OLEH ORANG YANG TERLATIH SAHAJA

Didaftarkan oleh :



IMP BIOTECH SDN. BHD. (Co. No. 462270-H)

33A, Jalan 5, Kawasan 16, Taman Intan,

41300 Klang, Selangor, Malaysia.

Tel.: 603 3345 3769 Faks : 603 3341 7089

BERACUN

JAUHKAN DARIPADA MAKANAN
DAN KANAK-KANAK

KELAS II

POISONOUS

KEEP AWAY FROM FOODSTUFF
AND CHILDREN

有毒品

勿貯藏在靠近食品或兒童所接觸
的地方

நஞ்சு

உணவுகள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு
அருகில் வைக்காதீர்

MASGONE ialah sejenis racun serangga yang mengandungi perawis aktif daripada kumpulan 'carbamate' yang bertindak secara sentuhan dan keracunan perut untuk mengawal serangga perosak seperti jadual di bawah.

ATURAN PENGGUNAAN : Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.

TEMPAT / KEADAAN	PEROSAK	KADAR SERANGAN	KADAR RACUN	ISI PADU SEMBURAN
Bangunan Awam, Gudang / Kilang, Kandang Ternakan, Tempat Pembuangan Sampah, Tempat Kediaman	Nyamuk (<i>Aedes aegypti</i> , <i>Aedes albopictus</i>) Lalat (<i>Musca domestica</i>) Lipas (<i>Periplaneta americana</i> , <i>Blattella germanica</i>) Semut (<i>Solenopsis invicta</i>)	Sederhana	12.5 ml / liter air	50 ml / m ²
		Teruk	25 ml / liter air	

Kosongkan kandang sebelum semburan dilakukan. Masukkan semula ternakan sekurang-kurangnya 7 hari selepas semburan dilakukan.

Panduan Membancuh : Disyor menggunakan alat penyembur gelas bernozel "cone". Isikan tangki setengah penuh dengan air bersih. Campurkan **MASGONE** secukupnya mengikut syor yang ditetapkan dalam jadual sukatan dan bancuh. Seterusnya masukkan bancuhan ke dalam tangki alat penyembur dan tambah baki air bersih yang diperlukan dan kacau. Jangan guna pada kadar lebih tinggi daripada yang disyorkan. Jangan simpan baki bancuhan **MASGONE** di dalam tangki alat penyembur.

Panduan Menyembur : Semburkan ke atas permukaan di mana serangga sering berkeliaran, serta ke dalam rekahan/lubang/tempat pembiakan atau persembunyan mereka. Permukaan yang disembur akan memberikan kesan kawalan sisa baki. Membasuh atau mengelap permukaan tersebut selepas menyembur akan menjejaskan kesan sisa baki. Jangan sembur pada atau berhampiran dengan makanan atau tempat penyediaan makanan termasuk makanan ternakan.

AWAS : a) Bahaya Kepada Manusia : Berbahaya jika terminum. Elakkan daripada terhidu wasap atau kabus semburan. Elakkan daripada terkena kulit atau mata. Ketika mengendalikan produk ini, **JANGAN** makan, minum, atau merokok. Selepas mengendalikan produk ini, pastikan tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat berkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. Cuci alat penyembur sebersih-bersihnya selepas menggunakannya. Pastikan mandi sebersih-bersihnya menggunakan sabun dan air yang banyak.

Pakaian dan Alat Perlindungan : Ketika mengendalikan produk ini, pastikan pakai pakaian pelindung diri (PPE) berpiawaian termasuk sarung tangan, gogal, kasut getah, penutup muka dan alat pernafasan.

b) **Bahaya Pada Alam Sekitar :** Produk ini adalah berbahaya pada ikan. **JANGAN** cemarkan kolam, sungai atau saliran air.

TANDA KERACUNAN : Pandangan kabur, sesak nafas, mual, kejang otot, besar ludah dan sawan.

RAWATAN KECEMASAN : Tanggalkan pakaian yang terkena racun. Jika terkena pada kulit, basuh dengan menggunakan sabun dan air. Jika terkena pada mata, bersihkan dengan menggunakan air bersih yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika tertelan, **JANGAN** ikhtiarkan pesakit itu muntah. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

RAWATAN PERUBATAN : Suntik Atropina sulfat (2-4 mg) secara intravena atau intraotot. Ulang setiap 30 minit sehingga pesakit itu pulih dengan sepenuhnya. Kemudian suntik pralidoksim (1 g) secara intravena, jika perlu.

MEDICAL TREATMENT : Inject Atropine sulphate (2-4 mg) intravenously or intramuscularly. Repeat every 30 minutes until the patient is fully atropinised. Then administer pralidoxime (1 g) intravenously, if necessary.

BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPUSKANNYA. JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.