

KELUARAN INI TIDAK DISYORKAN JIKA BURUNG PUNGGUK JELAPANG DIGUNAKAN UNTUK MENGAWAL TIKUS.

EBOR 401[®]

UMPAN BERBUNGKAH (BB)

RACUN TIKUS / RODENTICIDE



Perawis Aktif: bromadiolone.....0.005% w/w
Perawis Lengai:.....99.995% w/w

Jika berlaku KERACUNAN, sila hubungi:
PUSAT RACUN NEGARA - 1-800-88-8099 (waktu pejabat)
- 012-4309499 (lepas waktu pejabat)

BACA LABEL SEBELUM GUNA

Tarikh Mengilang:

No. Pendaftaran: LRMP. R1/7958



Didaftarkan dan diedarkan oleh:
Sime Darby Agri-Bio Sdn Bhd (86904-K)
Level 8, Main Block, Plantation Tower, No.2, Jalan PJU 1A/7,
Ara Damansara, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.
Tel.: 03-7848 4000 Faks: 03-7848 5129

Kandungan Bersih: 10 kg **Plantation**

® EBOR 401 IS THE REGISTERED TRADEMARK OF SIME DARBY AGRIO-BIO SDN BHD

JAUHKAN DARIPADA
MAKANAN DAN KANAK-KANAK

KELAS IV

KEEP AWAY FROM
FOODSTUFF AND CHILDREN

EBOR 401[®]

UMPAN BERBUNGKAH (BB)

Ebor 401 ialah racun tikus daripada kumpulan coumarin anticoagulant yang bertindak sebagai pencegah pembekuan secara langsung (antikoagulan).

ATURAN PENGGUNAAN: Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan.

Tanaman	Perosak	Cara Mengumpan	Kadar/Hektar	Catatan
Sawit	Tikus (<i>Rattus tiomanicus</i>)	Letak 1 umpan pada setiap pokok, selang setiap barisan sawit.	75 umpan	Gantikan umpan-umpan tikus yang hilang setiap 4 hari sehingga kadar penerimaannya kurang daripada 20%
Koko		Letak 1 umpan pada pokok yang keempat selang setiap baris yang keempat.		

BUTIR (GR). UMPAN BERBUNGKAH (BB)

AWAS: a) Bahaya Kepada Manusia: Berbahaya jika tertelan/termakan. Elakkan daripada terhidu debu. Elakkan daripada terkena kulit atau mata. Ketika mengendalikan produk ini, **JANGAN** makan, minum atau merokok. Selepas mengendalikan produk ini, pastikan tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat berkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. Pastikan cuci tangan sebersih-bersihnya menggunakan sabun dan air yang banyak. **JANGAN** mengumpan racun ini di tempat yang senang dicapai oleh kanak-kanak dan haiwan berguna.

Pakaian dan Alat Perlindungan: Ketika mengendalikan produk ini, pastikan pakai pakaian pelindung diri (PPE) berpiawalan termasuk sarung tangan.

b) Bahaya Pada Alam Sekitar: Produk ini adalah berbahaya pada ikan, mamalia dan burung. **JANGAN** cemarkan kolam, sungai atau saliran air.

TANDA KERACUNAN: Letih, lesu, hilang selera makan, hidung dan gusi berdarah, najis dan kencing berdarah dan pendarahan sedikit di bawah kulit.

RAWATAN KECEMASAN: Tanggalkan pakaian yang terkena racun. Jika terkena pada kulit, basuh dengan menggunakan sabun dan air. Jika terkena pada mata, bersihkan dengan menggunakan air bersih yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika tertelan, ikhtiarkan supaya pesakit itu muntah dengan menjolok jari ke dalam kerongkong selepas diberi minum air. Ulangkan sehingga air muntah menjadi jernih. **JANGAN** beri apa-apa melalui mulut dan **JANGAN** ikhtiarkan pesakit itu muntah jika dia tidak sedar. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

RAWATAN PERUBATAN: Berikan vitamin K1 (dosej maksimum 65 mg) 3 kali untuk rawatan hari pertama dan kurangkan sukatan vitamin tersebut untuk rawatan seterusnya sehingga tempoh prothrombin menjadi biasa (normal). Untuk kejadian keracunan yang teruk, pemindahan darah mungkin perlu.

MEDICAL TREATMENT: Vitamin K1 (maximum dosage 65 mg) must be given 3 times on the first day of treatment and smaller doses continued until prothrombin time has reached normal. In severe cases, blood transfusion may be necessary.

JAMINAN: Kami bertanggungjawab di atas mutu kandungan keluaran ini.

**BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPUSKANNYA.
JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.**

勿儲藏在靠近食品或
儿童所接触的地方

KELAS IV

உணவுகள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு
அருகில் வைக்காதீர்